BEHVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

(AVEYRON. AUDE. GARD. HÉRAULT. LOZÈRE. PYRÉNÉES-ORIENTALES)
C. C. P. 723-61 - MONTPELLIER - 16, Rue de la République - Tél. 72 58-72

Quatrième ANNFF_{nº 18}

Ministère de l'Agriculture Eccle Nationale d'Agriculture de Montpellier

Montpellier, le I4 mai 1956

STATION REGIONALE d'AVERTISSEMENTS VITICOLES

MOTE nº 5

MILDIOU - Les manifestations du mildiou consécutives aux premières germinations des oeufs d'hiver, signalées par la Station dès le 22 avril, se sont accrues dela sortie de taches provenant des pluies du 27 avril.

Il en résulte qu'à l'heure actuelle le mildiou existe déjà sur le territoiredes communes comprises entre le Gardon et le Vidourle depuis la partie méridionale de la région d'Anduze jusqu'au sud de Vauvert.

On le rencontre aussi dans la vallée moyenne de l'Hérault, et à proximité de l'étang de Vic.

Par ailleurs il en a été découvert dans les vignobles irrigués du Narbonnais.

Certes il est encore localisé à la végétation traînant sur le sol, et le mistral qui souffle depuis plusieurs jours, n'est pas favorable à son extension.

Mais il conviendra de profiter du beau temps actuel pour débarrasser d'urgence le pied de la souche des repousses inutiles qui l'encombrent et qui sont encore les seules à être contaminées. Une pluie importante se produisant dans quelques jours provoquerait sur les inflorescences une extension dangereuse de la maladie,

Il y a donc lieu partout où la végétation est suffisemment développée d'effectuer le premier traitement.

FUDEMIS - Dans les vignobles de Béziers-Contrôle, l'importance du vol de papillons justifie l'application d'un traitement dès le 15 mai.

Cette recommandation est valable pour Aspiran, St-Georges d'Orques et Pont St-Esprit (Gard) où les captures sont cependant nettement inférieures.

Ailleurs le nombre de prises est très faible et quelquefois même le piégeage est suspendu par les viticulteurs, ceux-ci n'étant pas inquiétés p r le parasite.

COCHYLIS - Un vol très important de cochylis se poursuit dans le nord du Gard, à Pont St-Esprit.

On pourra traiter à l'arséniate de plomb ou à la roténone dès le I8 mai, ou attendre la fin du mois pour utiliser les esters phosphoriques si l'on ne redoute pas les attaques de l'arraignée rouge.

DLP 17-5-56 049363

Le Directeur dela Station Régionale

d'Avertissements Viticoles 7/38

Imprimé à la Station d'Avertissements Agric. du Long. Roussillon, 16 rue République Montpellier so corant: Trous Lion. Autor du 6 Mars 1956. Reproduction, adaptation réservées.